RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ARRÊT DE TOUT **TRAITEMENT ANTI-MYCOSIQUE** AVANT UN PRELEVEMENT A VISEE MYCOLOGIQUE

- Lors de la prise de rendez-vous, la secrétaire devra s'enquérir d'un traitement local ou général chez le/la patiente concerné(e).

- Si un traitement a été institué, la secrétaire devra vérifier qu'aucun produit appartenant à la liste ci-dessous n'a été appliqué ou ingéré.

- Dans le cas où l'un de ces produits aurait été appliqué, un nouveau rendez-vous sera proposé :
  - Pour un prélèvement cutané : 2 semaines au minimum après arrêt du traitement
  - Pour un prélèvement d'ongle :
    * 2 semaines au minimum après arrêt du traitement par crème et/ou poudre
    * 2 mois au minimum après arrêt du traitement par voie orale et/ou par vernis

- Liste des anti-mycosiques à proscrire :

VERNIS

- AMOROLFINE ®
- **CICLOPIROX®**
- LOCERYL ®
- MYCONAIL®
- ONYTEC®

POUDRE

- DAKTARIN®

VOIE ORALE

- **LAMISIL ®**
- **TERBINAFINE®**

CREME

- AMYCOR ®
- **CICLOPIROX®**
- DERMAZOL ®
- ECONAZOLE ®
- FAZOL ®
- FONGAMIL ®
- FONGILEINE ®
- FONX ®
- GYNOPURA®
- KETOCONAZOLE®
- KETODERM ®
- **LAMISIL ®**
- LAMISILATE®
- LAMISILDERMGEL®
- LOMEXIN ®
- MONAZOL ®
- MYCOAPAISYL ®
- MYCODECYL ®
- MYCOSEDERMIL®
- MYCOSKIN®
- MYCOSTER ®
- MYLEUGYNE®
- PEVARYL ®
- PEVISONE®
- **TERBINAFINE®**
- TROSYD®

REGIMES ALIMENTAIRES A RESPECTER POUR CERTAINES ANALYSES

1 Sérotonine urinaire – 5HIA urinaire

Eviter dans les 48 heures précédant le dosage, la consommation de banane, chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, tomate, prune, kiwi, ananas, mollusques

2 Hydroxyproline libre dans les urines

Eviter dans les 48 heures précédant le dosage, la consommation d'aliments riche en collagène (viande, gelée, gélatine, glaces, sucreries, charcuterie).

3 Porphyrines fécales

Eviter dans les 72 heures précédant le dosage, la consommation de légumes verts et de viande rouge saignante.

4 Métanéphrines – catécholamines

Régime alimentaire excluant chocolat, banane, agrume et comprenant une consommation modérée de thé et de café dans les 48 heures précédant le prélèvement. Le traitement par β bloquants peut interférer dans le dosage.

5 Acide homovanillique (HVA) – Acide vanyl-mandélique (VMA)

Eviter dans les 48 heures précédant le dosage, la consommation de banane, vanille, thé, café, chocolat.